

# VOLTIO 400 WP<sup>®</sup>

Polvo Mojable (WP) - Registro Nacional ICA 2347



## COMPOSICIÓN

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

**Myclobutanil**..... **400 Kg**  
(RS)-2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile.

**Ingredientes Aditivos e Inertes**:..... **c.s.p 1 Kg**

## INFORMACION GENERAL

**VOLTIO 400 WP** es un fungicida que posee acción sistémica, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes; compuesto por Myclobutanil que pertenece al grupo de los Triazoles con efecto sobre las esporas y estructuras de desarrollo que inhibe el proceso de la biosíntesis del ergosterol. Es absorbido rápidamente por las plantas y actúa eficientemente en el control en un amplio grupo de enfermedades que causan grandes pérdidas al cultivo de arroz, tomate y banano presentando un amplio espectro de control en hongos.

## PRESENTACIONES

**VOLTIO 400 WP** se encuentra en presentaciones de 40gr, 400gr y 1 Kg

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## COMPATIBILIDAD

Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- \* No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- \* No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- \* Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- \* Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- \* Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, máscara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- \* Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- \* Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- \* Causa irritación moderada a los ojos

## MANEJO DE ENVASES

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco ). Siempre mantenga el producto en su empresa original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá

## DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	*P.R.	*P.C.
TOMATE	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ).	100 g/ha	4 horas	1 día
ARROZ	<i>Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani Kühn)</i>	100 g/ha	4 horas	1 día
BANANO	<i>Pudrición de corona (Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum musae, Deightonella torulosa y Fusarium roseum)</i>	600 ppm*	NA	NA



Calle 108 #51-81, Bogotá, Colombia  
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831  
[colombia@agrocentro.info](mailto:colombia@agrocentro.info)  
[www.colombia.agrocentro.com](http://www.colombia.agrocentro.com)

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

