NEFASTO 350 WG®

Concentrado emulsionable - REGISTRO ICA 2133

Insecticidas

de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:
Tiametoxam.....300 g/kg
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazin-an-4-ylidene(nitro)amine
Emamectin Benzoato.....50 g/kg

INFORMACIÓN GENERAL

NEFASTO 350 WG es un insecticida con acción sistémica y de contac to que controla adultos y estados inmaduros del insecto..
El extraodrinario efecto de ingestión le confieren a NEFASTO la efectividad en el control de insectos consumidores del tejido tratando,especialmente lepidápteros.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con bajas poblaciones y larvas en los primeros estados de desarrollo. Se recomiendo una sola aplicación por ciclo de cultivo.

PRESENTACIONES

NEFASTO 350 WG se encuentra en presentación de 100gr, 500gr y 1 Kilo.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. , No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos , Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado, Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, mascara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho, Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón , Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente. ,Causa irritación moderada a los ojos.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):
CISPROQUIM:
01-8000-916012 Fuera de Bogotá
2886012 En Bogotá.

agrocentro® Colombia, S.A.S.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.R.	*P.C.
MAÍZ	Spodoptera frugiperda J.E.Smith	80 gr/Ha	12 horas	14 días
ARROZ	*Spodoptera frugiperda J.E.Smith*	80 gr/Ha	12 horas	14 días
TOMATE	*GUSANO ROSADO* *Neoleucinodes elegantalis*	100 gr/Ha	04 horas	14 días

agrocentro® Colombia, S.A.S.

Calle 108#51-81 Barrio Pasadena, Bogotá, Colombia
Telefonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com

Colecta
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS
CISPROQUIM
PARA COLOMBIA 01 8000 916012 PARA PERÚ 080-050-647
PARA ECUADOR 1800-59-3005 PARA VENEZUELA 08001005012
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HORAS

PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS
CISPROQUIM
FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 916012
BOGOTÁ 288 6012
LAS 24 HORAS