

TACTIKO 480 EC[®]

Concentrado emulsionable - REGISTRO NACIONAL ICA 2288



Herbicida



de uso agrícola

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

CLOMAZONE 480 g/L
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one, por Litro de formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos:..... c.s.p. 1 Litro

INFORMACIÓN GENERAL

TACTIKO 480 EC es un herbicida sistémico, selectivo que se absorbe por las raíces y brotes, y es translocado hacia arriba. Se aplica en preemergencia o en pre siembra con un excelente control de malezas gramíneas principalmente. Actúa sobre la biosíntesis de los pigmentos fotosintéticos produciendo síntomas de blanqueamiento en algunas especies. Cuando la planta comienza a germinar o emerger presenta una deficiencia en la pigmentación (amarillo claro) y muriendo pocos días después.

PRESENTACIONES

TACTIKO 480 EC se encuentra en presentación de 1L, 20L y 200L.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, máscara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- Causa irritación moderada a los ojos

MANEJO DE ENVASES

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO OPERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	*P.R.	*P.C.
Arroz Oryza sativa	<i>Echinochloa colona</i> (liendre puerco) <i>Digitaria sanguinalis</i> (guarda rocío) <i>Eleusine indica</i> (pata gallina) <i>Ischaemun rugosum</i> Salibs (falsa caminadora) <i>Pasapalum pilosum</i> (paja peluda) <i>Leptochloa filiformis</i> (paja mona).	1.25L/Ha	12 Horas	N.A



Calle 108 # 51-81, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

